

**ŽÁDANKA O SPECIÁLNÍ VYŠETŘENÍ
V TOXIKOLOGICKÉ LABORATOŘI (metanefriny aj.)**

Pro každý materiál je
nutné mít vlastní žádanku.

ID:	ŽADATEL:	
Příjmení:	Razítko zdravotnického zařízení:	
Jméno, titul:	Kontaktní telefon:	
Pohlaví <input type="checkbox"/> muž <input type="checkbox"/> žena		
Pojišťovna: Diagnosa č.:	Jméno a podpis lékaře:	
Bydliště:		
Vzorek <input type="checkbox"/> krev <input type="checkbox"/> moč <input type="checkbox"/> jiný:		
Odebral: datum: čas:		
K dezinfekci kůže a nástrojů bylo použito:		

Klinický stav pacienta, medikace, poznámky lékaře:

Informace pro žádající lékaře:

- Všechna speciální vyšetření jsou prováděna 1x týdně, tzn. doba odezvy cca 1 týden
- **Před odběrem je nutné poučit pacienta o dietních a dalších omezeních, posoudit pravidelně užívané léky**

Pokyny k odběru:

- Před samotným odběrem krve je nutný odpočinek pacienta po dobu 15–30 minut; odběr krve je proveden standardním způsobem; odběrová souprava uvedena u jednotlivých vyšetření;
- Pro vyšetření z moče je potřeba uvést diurézu – celkový objem moče a dobu sběru
- **Materiál k vyšetření je třeba doručit do laboratoře bezodkladně, max do 1 hodiny po odběru (příjem materiálu v prac. dny 07-15 h)**

Poučení pro pacienty:

- Dietní omezení: min. 24 h před odběrem je nutné vynechat některé potraviny a nápoje: alkohol, banány, ořechy, ananas, rajčata, avokádo čokoláda, káva (i bezkofeinová), kakao, čaj, další nápoje obsahující kofein;
- Min. 24 h před odběrem se vyvarovat nikotinu
- Řada léků ovlivňuje vyšetření metanefrinů, HIOK a VMA. Proto je nutné před vyšetřením s lékařem konzultovat případné přerušení léčby či změny v medikaci. Mezi interferující léky patří například: paracetamol (pozor na kombinovanou léčiva), aminofylin, amfetaminy, klonidin, dexamethazon, diuretika, epinefrin, alkohol, inzulin, imipramin, lithium, methylidopa, inhibitory MAO (monoaminoxidázy), nikotin, nitroglycerin, nosní kapky, salicyláty, teofylin, tetracyklin, tricyklická antidepresiva a betablokátor. Dále některá léčiva zvyšují VMA: aminosalicylát (PAS), anileridin, aspirin, bromsulphalein, erytromycin, glyceryl, guaiacolate, isoproterenol, mephesisin, methocarbamol, nalidixová kys., tetracyklinová a penicilinová antibiotika, phenazopyridin, PSP, phenothiazin, theophylin a léčiva zvyšující HIOK: acetanilid, acetophenetidin, mephesisin, methocarbamol, reserpin, Lugolův roztok. Vliv uvedených látek se mění individuálně a nelze ho zcela jednoznačně předpovědět.

Vyšetření z krve	
2x zkumavka s K-EDTA (fialový uzávěr)	<input type="checkbox"/> Metanefrin a normetanefrin <input type="checkbox"/> HIOK (kyselina hydroxyindoloctová) <input type="checkbox"/> VMA (kyselina vanilmandlová)
2x zkumavka pro separaci séra SST II (zlatý uzávěr)	<input type="checkbox"/> Vitamin B6

Vyšetření z moče	
nutno uvést diurézu (objem, doba sběru)	
ml/	h
<input type="checkbox"/> Metanefrin a normetanefrin <input type="checkbox"/> HIOK (kyselina hydroxyindoloctová) <input type="checkbox"/> VMA (kyselina vanilmandlová)	

Datum a čas příjmu vzorku v laboratoři: